

Dotyková infúzia kyslíkom a psoriáza: Prípadová štúdia


Autori

Dr. D. Amuso, Dr. A. Battista

Úvod

Psoriáza je ochorenie, ktoré postihuje v priemere 3% (1%-5%) populácie. Juvenilná psoriáza sa objavuje približne vo veku 20 rokov a dospelá forma vo veku okolo 50 rokov. V Taliansku je postihnutých približne 1 700 000 ľudí. Pacienti s psoriázou majú signifikantne zhoršenú kvalitu života, u 15%-20% pacientov sa vyvinie stredne závažná až závažná forma psoriázy, u 10%-25% prípadov sa vyvinie psoriatická artritída. Psoriáza sa často vyskytuje spolu s inými ochoreniami: cukrovka, obezita, hypertenzia, dyslipidémia a iné.

Dostupná liečba je symptomatická, často kozmeticky neakceptovateľná a niekedy tiež škodlivá pre pacientov. U viac ako ¼ liečených prípadov nedochádza k naplneniu klinických potrieb.



Metódy

U pacientov s estetickými problémami a problémami spôsobenými starnutím sme si pri liečbe dotykovou infúziou kyslíkom všimli, že u tých, ktorí mali psoriázu, došlo k jej klinickému zlepšeniu. Chrasty na léziách strácali svoj charakteristický klinický prejav.

Požiadali sme o pomoc dermatológov a niektorí pacienti so stredne závažnou až závažnou psoriázou so súhlasom podstúpili liečbu Kyslíkovou dotykovou infúziou (prístroj Oxy Xtra Med, Taliansko).

Protokol procedúr pre pacientov bol nasledovný:

2 aplikácie za týždeň, každé miesto postihnuté léziami bolo liečené minimálne 8 minút po dobu 12 týždňov. Všetci pacienti absolvovali procedúry dobrovoľne. V prípade nedostatočnej efektivity procedúry podstúpili pacienti klasickú liečbu u dermatológa.



Výsledky

Metóda dotykového infúzie kyslíkom nenahrádza základnú a potrebnú liečbu psoriázy, ale pretože nemá kontraindikácie a preukázala sa ako vhodný nosič liečivých látok myslíme si, že je to dôležitá podporná liečba pre všetky typy psoriázy so sprievodnými ochoreniami.